

Resultados de la artroplastia de tobillo

Martín X¹, Santamaría A², Méndez JM³, López L²

¹Universidad de Barcelona, Barcelona, España.

²Consorci Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España.

³Clinica MC Mutual, Barcelona, España.

Publicado en:

Monografías de actualización de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo. Nº6 - Año 2014. Artrodesis vs. Artroplastia de tobillo. Estado actual y fuego cruzado de Casos Clínicos.

Capítulo 10, págs 75-80. Resultados de la artroplastia de tobillo.

ISSN: 2254-240X

Resumen:

La afectación degenerativa de la articulación tibioastragalina tiene repercusiones sobre los pacientes, condicionando un déficit funcional severo y una disminución en la calidad de vida. La artrodesis es la técnica más utilizada en las fases avanzadas de artrosis de tobillo. En los últimos años la artroplastia se está haciendo un espacio como alternativa de tratamiento y, por ello, cada vez más sus indicaciones y su utilización tienen una curva ascendente progresiva. La revisión de la bibliografía muestra unos resultados esperanzadores en el tratamiento de la artropatía de tobillo mediante artroplastias. En nuestra serie de 159 prótesis (2005-2011) del modelo Salto (Tornier, Saint Ismier, Francia) hemos revisado 119 pacientes, con un follow-up mínimo de 18 meses. El resultado AOFAS se incrementó en 62,4 puntos (14-85), de un valor preoperatorio de 27,7 puntos (10-60) hasta un valor en la revisión final de 90,1 puntos (51-100) ($p < 0,001$). 17 pacientes han presentado complicaciones (14,3%) siendo la más frecuente la fractura maleolar periprotésica. Como conclusión, creemos que la prótesis de tobillo es un tratamiento válido y fiable en el tratamiento de la artropatía degenerativa del tobillo

Si desea ampliar información, puede contactar con:

José Manuel López Méndez

e-mail: jmendezl@mc-mutual.com